

Leeuw (*Panthera leo*), Ghana. Er zijn tegenwoordig in Afrika nog zo'n 15.000 leeuwen, die vrijwel uitsluitend in reservaten leven; in India is een kleine populatie van ongeveer 350 Perzische leeuwen. Omdat de leeuw schadelijk was voor de veestapel is hij al vroeg in de Romeinse tijd in Europa uitgeroeid. Rond 1900 kwam hij ook al niet meer voor in het noordwesten van Afrika (Berberleeuw) en in Zuid-Afrika (Kaapse leeuw).



Lammergeier (*Gypaetus barbatus*), Lesotho. Het leefgebied van de lammergeier bestaat uit de hooggebergten van Azië, Europa en Noord-Afrika. In de Alpen is hij rond 1900 verdwenen. Sinds de jaren 1970 is er een grootschalig herintroductieproject gestart. De eerste broedgevallen van uitgezette oudvogels zijn ondertussen succesvol geweest.



Vogels van Micronesië: Micronesische ijsvogel (*Halcyon cinnamomina reichenbachii*), Micronesische duif (*Ducula oceanica oceanica*), Micronesië. Vanwege hun beperkte verspreiding zijn eilandsoorten altijd kwetsbaar. De Micronesische ijsvogel heeft vier ondersoorten, de Micronesische duif vijf. Daarvan zijn enkele bedreigd.



Savannoolifant (*Loxodonta africana africana*), Mozambique. Van de vijf tot tien miljoen olifanten die er ooit waren zijn er nu een kleine 10% over. Ze worden nog steeds bejaagd om hun ivoor en andere jachttrofeeën, en omdat ze landbouwgronden verwoesten. Maar ze worden tegenwoordig tegelijk zo goed beschermd, dat ze in sommige natuurparken te talrijk worden. Olifanten zijn de grootste landdieren.





Clymenedolfin (Stenella clymene), Grenada. Deze dolfin is pas in 1981 als afzonderlijke soort erkend. Voorheen werd hij verward met de langsnuitdolfin (*Stenella longirostris*). Vanwege deze verwarring zijn de omvang van de tegenwoordige populatie en zijn huidige status onbekend. In de Caraïben worden ze gevangen om hun vlees; in West-Afrika zijn ze soms het slachtoffer van bijvangst.



Duikers: blauwrugduiker (Cephalophus rufilatus); Maxwells duiker (C. maxwelli); zwartrugduiker (C. dorsalis); geelrugduiker (C. sylvicultor). Togo. Duikers zijn kleine, zeer schuwe antilopen uit West- en Centraal-Afrika. Ze worden momenteel nog niet bedreigd in hun voortbestaan. Maar de voortgaande ontbossing en bejaging om hun kostbare muskus kunnen voor de toekomst een probleem opleveren.



Neusaap (Nasalis larvatus), Brunei. Het dreigendste gevaar voor deze grootste Aziatische slankaap is de boskap op het eiland Borneo, waardoor zijn leefgebied steeds kleiner wordt. Naar schatting waren er in 2006 nog slechts 3000. Bijkomend probleem is dat de soort nauwelijks in gevangenschap is te houden. De verwachting is dat de neusaap over tien jaar is uitgestorven.



Tijgerhaai (Galeocerdo cuvier), St. Kitts. Deze indrukwekkende haai, die ook voor de mens gevaarlijk kan zijn, heeft sinds 2005 de status 'gevoelig'. In de zeeën van Oost-Azië wordt er door vissers flink jacht op hem gemaakt. Zijn vinnen worden verwerkt in gerechten, vooral de haaienvinnensoep.





Bruine hyena (*Hyaena brunnea*), Botswana. De bruine hyena of strandwolf is een aaseter, die leeft in het zuiden van Afrika. Hij jaagt soms op kleine dieren. Het dier past zich heel gemakkelijk aan en is tegenwoordig ook te vinden op de grote vuilnisbelten van Pretoria en Johannesburg. In zijn natuurlijke omgeving, zoals de stranden van Namibië, waar hij aangespoelde karkassen zoekt, komt hij echter steeds minder voor.



Grote koedoe (*Tragelaphus strepsiceros*), Zambia. Dit hoefdier van de grote savannes van oostelijk en zuidelijk Afrika is nog niet direct bedreigd. Maar zijn oorspronkelijke grote verspreidingsgebied is wel behoorlijk geslonken. Hij komt vrijwel uitsluitend voor in natuurparken. Als hij zich daarbuiten bevindt maakt hij grote kans door lokale bewoners gedood te worden als jachttrofee of om zijn vlees als voedsel.



Nyassa dwergpapegaai (*Agapornis lilianae*), Malawi. Deze kleine en levendige papegaai heeft een klein verspreidingsgebied in en rondom Malawi. Zijn aantal wordt op ongeveer 20.000 exemplaren geschat. In het Liwonde National Park geniet hij bescherming, maar daarbuiten is toenemende bevolkingsdruk de grootste oorzaak van zijn achteruitgang. In gevangenschap plant hij zich bijzonder moeilijk voort.



Grijpstaartstekelvarken (*Coendou prehensilis*), Trinidad en Tobago. Stekelvarkens zijn knaagdieren. Deze soort leeft in tropisch Zuid-Amerika ten oosten van de Andes. Hij bewoont bomen, waarin hij zich met behulp van zijn grijpstaart gemakkelijk voort beweegt, en is vooral 's nachts actief, zodat hij niet direct gevaar loopt. Maar op den duur zal de voortschrijdende ontbossing zijn leefgebied steeds kleiner maken.





Maleisische olifant (*Elephas maximus hirsutus*), Cambodja. Deze variant van de indische olifant (die op zijn beurt een ondersoort van de Aziatische olifant is), die in Achter-Indië leeft, komt nog in slechts enkele wildparken voor. Hij is in zijn voortbestaan bedreigd.



Maleisische olifant (*Elephas maximus hirsutus*), Cambodja. Verlies van habitat en fragmentatie van zijn bosrijke leefgebied door steeds verder oprukkende menselijke activiteiten zijn daarvan de eerste oorzaak. Een tweede oorzaak is de illegale handel in ivoor. Omdat de olifant steeds zeldzamer wordt, stijgt de prijs van dit materiaal, waardoor de jacht op het dier steeds lonender wordt.



Gewoon stekelvarken (*Hystrix cristata*), Mali. Dit zeer bijzondere, grote knaagdier komt algemeen voor in Noord-Afrika, maar ook in sommige gebieden van Zuid-Europa. De soort is nog niet direct bedreigd in zijn bestaan. Maar zijn relatief langzame voortplanting maakt hem wel kwetsbaar voor verstoringen in zijn leefgebied, die helaas steeds meer voorkomen.



Okapi (*Okapia johnstoni*), Zaire. Dit giraffe-achtige hoefdier is pas in 1901 ontdekt. Hij leeft in de dichte jungles van Noord-Congo (tot 1997 Zaire). Habitatvernietiging en jacht om zijn vlees zijn in een gebied met voortdurende burgeroorlogen en afwezig overheidsgezag een serieuze bedreiging voor zijn voortbestaan. Gelukkig is de okapi een zeer schuw en oplettend dier.





Paardantilope (*Hippotragus equinus*), Mozambique. Deze grote, stevige antilope, met sterke nek en schouders en ruige vacht, heeft zijn verspreidingsgebied in zowel de noordelijke als de zuidelijke savannen van Afrika. De jongen zijn kwetsbaar voor roofdieren, de oudere dieren voor habitat-verlies en stropers. De aantallen nemen af, maar er is nog geen sprake van zorg om zijn voortbestaan.



Snormerkat (*Cercopithecus cephus*), Angola. Deze primaat, een lid van de echte meerkatten, wordt in het wild aangetroffen in de oerwouden van westelijk Centraal-Afrika. Hij eet vruchten en zaden en leeft in groepen tot maximaal 35 individuen. Als gevolg van bejaging om zijn vlees en ontbossing worden de populaties langzaam kwetsbaarder. Maar de soort past zich gemakkelijk aan en is daarom nog niet echt bedreigd.



Comorenvleerhond (*Pteropus livingstonii*), Comoren. Deze grote vleermuis komt uitsluitend voor op de Comoreneilanden Anjouan en Moheli. In 2002 werd zijn aantal daar op 1200 geschat, verspreid over 20 nesten. Als er niets wordt ondernomen voor de instandhouding van zijn natuurlijke habitat zal de soort over tien jaar zijn uitgestorven. Op Jersey is daarom een afzonderlijk kweekprogramma gestart.



Afrikaans boomschubdiër (*Phataginus tricuspis*), Togo. Dit bijzondere dier leeft in de bomen van de Afrikaanse laaglandregenwouden. Hij gebruikt zijn staart als grijpinstrument. Zijn voedsel bestaat uit mieren en termieten. De afgelopen 15 jaar is de populatie teruggelopen met zo'n 25 procent. Het wordt gevangen door de lokale bevolking voor consumptie.





Saffierdwergkeizervis (*Centropyge resplendens*), Ascension. Deze kleine, aantrekkelijke vis komt alleen voor in de wateren rondom het kleine Atlantische eiland Ascension. Juist dit feit maakt hem kwetsbaar in zijn voortbestaan. Hij is erg gevoelig voor verstoring van zijn habitat en de waterkwaliteit. Zolang Ascension een eiland met weinig bewoners en weinig rioolafval blijft is hij in zijn voortbestaan verzekerd.



Roze pelikaan (*Pelecanus onocrotalus*), Oekraïne. Deze grote watervogel - hij kan wel 13 kg zwaar worden - heeft vooral in Afrika een aanzienlijke populatie. Hij broedt in kleinere aantallen ook in Europa en Azië. Maar de aantallen lopen daar als gevolg van menselijke activiteiten en industrialisatie wel terug, vooral in de Donau-delta en andere gebieden rond de Zwarte Zee. Hij is uitgeroepen tot beschermde trekvogel.



Leptodactylus fallax, Montserrat. Het verspreidingsgebied van dit amfibië is teruggedrongen tot 25 km² op Dominica en 20 km² op Montserrat. In 2004 is hij uitgeroepen tot ernstig bedreigde diersoort. De soort wordt bedreigd door consumptie door de mens (hij schijnt zeer smakelijk te zijn), oprukken van landbouwgronden en door natuurgeweld, zoals orkanen en vulkaanuitbarstingen.



Reuzenzebaars (*Epinephelus lanceolatus*), Vanuatu. Hij wordt ook wel donkere reuzentandbaars genoemd. Door het IUCN is hij als 'kwetsbaar' ingeschaald. Hij kan wel 2,5 meter lang worden en een gewicht van 400 kg bereiken, en komt voor bij koraalriffen in het hele Indo-Pacifische gebied. Als gevolg van overbevissing zijn de populaties in vele gebieden drastisch teruggelopen.





Reuzenboszwijn (*Hylochoerus meinertzhageni*), Guinée. Hij is het wilde zwijn van Afrika. Hij is groter dan zijn Europese tegenhanger. Dit zwaar gebouwde dier leeft verspreid over drie grote populaties in de dichte bossen van het noordelijke jungle-gebied. Hij is een gemakkelijke prooi voor jagers, die zijn vlees als bushmeat verhandelen. De meest westelijke populatie ondervindt daarvan de ernstigste gevolgen.



Grijze roodstaartpapegaai (*Psittacus erithacus*), Sao Tomé en Príncipe. Deze vogel leeft in de jungles van tropisch Afrika. Ze kunnen enorm goed allerlei geluiden imiteren en tot wel 750 woorden leren. Om deze bijzondere eigenschappen worden ze als huisdieren gehouden en bestaat er een levendige handel in deze vogel. De soort is nog niet direct bedreigd, maar door het IUCN inmiddels wel als 'gevoelig' ingeschaald.



Boomkangoeroes (*Dendrolagus spp.*), Papoea Nieuw-Guinea. Boomkangoeroes zijn buideldieren die uitsluitend voorkomen op het eiland Nieuw-Guinea en het uiterste noorden van Australië. Hier zijn vier soorten afgebeeld: de grijze boomkangoeroe (*D. inustus*), de Matschieboomkangoeroe (*D. matschiei*), de Doriaboomkangoeroe (*D. dorianus*) en de Goodfellowboomkangoeroe (*D. goodfellowi*).



Aardwolf (*Proteles cristatus*), Eritrea. De aardwolf is een hyena-achtige uit Oost- en Zuid-Afrika. Er leven in Afrika drie geïsoleerde maar vrij grote populaties. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit bepaalde soorten termieten, die hij met zijn kleverige tong oplikt. Dat doet hij vooral 's nachts. Door de lokale bevolking wordt hij als ongevaarlijk en nuttig gezien en daarom wordt hij niet bejaagd.



Indische griend (*Globicephala macrohynchus*), Caymaneilanden. Deze walvis met een lengte van 4 tot 5,5 meter komt voor in alle tropische en subtropische zeeën. De soort heeft ernstig geleden door de krachtige El Niño in 1982/83. In de wateren rond Japan wordt hij voor consumptie gevangen. Vaak wordt hij ook als onbedoelde vangst in grote visnetten aangetroffen. Aanvaringen met schepen horen ook tot de bedreigingen.



Gems (*Rupicapra rupicapra*), Albanië. Dit hoefdier leeft in de berggebieden van Midden- en Oost-Europa, Turkije en de Kaukasus. Er is in het verleden veel jacht gemaakt op deze dieren om hun bijzonder smakelijke vlees en om het prachtige dunne leer (zeemleer) dat van de huid gemaakt wordt. Het leefgebied van de gems is dan ook fors ingekrompen. De meesten komen nu nog voor in de Alpen.



Nandoe (*Rhea americana*), Uruguay. Deze op een struisvogel lijkende loopvogel komt voor in de pampa's en andere vlakten van Zuid-Amerika. De populatie is flink achteruitgegaan als gevolg van jacht om zijn vlees, eieren, huid en veren. Oprukkende landbouw verkleint hun leefgebied. Boeren jagen op deze vogels omdat ze als vernielers van akkers worden gezien. Ze kunnen ernstige wonden oplopen door in prikkeldraad verstrikt te raken.



Mona Islandboomslang (*Epicrates monensis granti*), Britse Maagdeneilanden. Deze niet-giftige slang van ongeveer een meter lengte komt alleen voor op Puerto Rico en de Maagdeneilanden. Deze kleine verspreiding maakt hem extra kwetsbaar voor exoten zoals ratten en katten en voor habitatverlies. Op de lijst van de IUCN staat hij ingeschaald als 'Endangered' (Bedreigd).



The Endangered Wildlife Postage Stamp Collection

Poema (*Puma concolor*), Canouan. Deze katachtige komt voor in Midden- en Zuid-Amerika en in het westen van Noord-Amerika. Het dier heeft in veel van zijn leefgebieden een beschermde status. In grote delen van Amerika is hij inmiddels echter uitgeroeid. De totale populatie van de poema daalt door stropen, habitatverlies en -fragmentatie.



Bruine boomkangoeroe (*Dendrolagus ursinus*), Cook Eilanden. Deze kangoeroe heeft de status 'Kwetsbaar' op de Rode Lijst van de IUCN. Dit door een geschatte afname van de populatie van 30% over de laatste dertig jaar. Het dier komt slechts voor op het eiland Nieuw-Guinea. De bedreigingen zijn de jacht door lokale bewoners op voedsel en het verlies van het leefgebied door het verdwijnen van bossen ten koste van leefgebied voor mensen.



Cook Islands \$4



Cook Islands \$4



Cook Islands \$4



Cook Islands \$4


Noord-Amerikaanse katfret (*Bassariscus astutus*), Dominica. Is een slank en lenig zoogdier uit de familie kleine beren (Procyonidae) dat vooral voorkomt in Mexico. Dankzij de legale jacht op zijn bont zijn er alleen al in Nieuw-Mexico en Arizona de afgelopen jaren circa 5.000 van deze dieren gevangen. Ook de vallen voor het duurdere bont van vossen en wasberen maken veel slachtoffers onder de Noord-Amerikaanse katfretten.



Pater-Davidshert (*Elaphurus davidianus*), Micronesië. Deze vertegenwoordiger van de herten is de enige levende in het geslacht *Elaphurus*. De IUCN-status van het dier is extreem zorgwekkend: in het wild is het Pater-Davidshert uitgestorven door jacht en habitat-verlies. In China zijn er inmiddels verschillende populaties onder bescherming uitgezet om totale uitsterving te voorkomen.



Federated States of MICRONESIA 28¢



Federated States of MICRONESIA 28¢



Federated States of MICRONESIA 28¢



Federated States of MICRONESIA 28¢

The Endangered Wildlife Postage Stamp Collection

Gewone octopus (*Octopus vulgaris*), Mozambique. Deze inktvis (zijn naam betekent 'achtarm') komt in diverse zeeën voor en leeft vooral 's nachts. Talloze dieren hebben deze octopus als prooi, waaronder zeebaarzen en murenen. In de Aziatische en Mediterrane keukens is het dier daarbij bijzonder geliefd. Ze worden daarom veel gevangen door vissers in deze gebieden.



COMMON OCTOPUS
MOÇAMBIQUE 16.00 MT



COMMON OCTOPUS
MOÇAMBIQUE 16.00 MT



COMMON OCTOPUS
MOÇAMBIQUE 16.00 MT

Californische condor (*Gymnogyps californianus*), Canouan. Deze roofvogel maakt deel uit van de gierenfamilie Cathartidae en is een uitstekend zweefvlieger. Hij kwam ooit voor in grote delen van Noord-Amerika. Tegenwoordig is hij in het wild praktisch uitgestorven en heeft hij de status 'kri-tiek' op de IUCN-Rode lijst. De primaire oorzaken hiervan zijn de jacht en vergiftiging door de mens.



CANOUAN \$3
GRENADINES OF ST. VINCENT



CANOUAN \$3
GRENADINES OF ST. VINCENT




CANOUAN \$3
GRENADINES OF ST. VINCENT



CANOUAN \$3
GRENADINES OF ST. VINCENT

Damagazelle (*Nanger dama*), Niger. Deze grootste soort gazelle wordt ernstig bedreigd en is bijna uitgestorven. Door ongecontroleerde jacht en habitatverlies in de laatste 10 jaar is maar liefst 80% van de populatie verdwenen. In totaal zijn er nog minder dan 500 exemplaren in het wild over. De IUCN-status is in enkele jaren bijgesteld van 'kwetsbaar' naar 'ernstig bedreigd (kritiek)'.



The Endangered Wildlife Postage Stamp Collection

Walvishaai (*Rhincodon typus*), Guinee-Bissau. De walvishaai is de grootste bestaande vis die leeft in de oceanen en zeeën tussen de tropische breedte. Ze leven voornamelijk van plankton, die ze door middel van een filterorgaan uit het zeewater filteren. De walvishaai is een bedreigde soort, maar toch wordt er in ontwikkelingslanden nog op ze gevestigd, voor hun vlees, huid en lever. Wereldwijd zijn er nog maar 1000 exemplaren geregistreerd.



Achtarm (*Octopus vulgaris*), Palau. Deze inktvis is één van de bekendste soorten, met een zakvormig lichaam, zonder inwendig skelet en een grote kop met opvallende spleetvormige ogen. Ze hebben een aantal natuurlijke vijanden, die ze proberen te ontwijken door over de rotsbodem te kruipen met veel beschutting. Bij direct gevaar vluchten ze weg, waarbij ze soms een inktvlek als afleidingsmanoeuvre gebruiken.



PALAU 28¢

PALAU 28¢

PALAU 28¢

PALAU 28¢

Koningspinguïn (*Aptenodytes patagonicus*), Rarotonga. Deze rond Antarctica levende pinguïnsort wordt bejaagd door orka's en zeelipaarden. Ook de eieren en kuikens zijn niet altijd veilig en vallen vaak ten prooi aan zuidpooljagers en zuidpoolkippen. Einde 19de eeuw werd de koningspinguïn bijna uitgeroeid voor hun olie door de grootste bedreiging, de mens. De kolonies beginnen langzaam te herstellen.

King Penguin *Aptenodytes patagonicus*



World of Wildlife

The Endangered Wildlife Postage Stamp Collection

Koningstrekker (*Balistes vetula*), Barbados. Deze straalvinnige vis uit de familie van trekkerissen (Balistidae) komt voor in de Atlantische Oceaan. Met zijn gedrongen vorm kan het dier een maximale lengte van 60 centimeter en een maximaal gewicht van 5440 gram bereiken. Vooral voor de hengelsport heeft het dier grote waarde. Ook wordt hij gevangen voor commerciële aquaria. De status de IUCN-lijst is 'kwetsbaar'.



Vierteenlandschildpad (*Testudo horsfieldii*), Armenië. Deze schildpad uit de familie landschildpadden (Testudinidae) wordt ook wel de Russische vierteenlandschildpad genoemd. Het dier leeft in warme en droge streken in Zuid-Rusland en Centraal-Azië. Habitatdestructie en -degradatie zijn de grootste bedreigingen en zorgen voor een somber vooruitzicht voor deze schildpad. De IUCN Rode Lijst kwalificeert het dier als 'kwetsbaar'.



Blaue maanvlinder (*Hypolimnas bolina*), Aitutaki. Deze vlinder komt uit de familie Nymphalidae. Met zijn spanwijdte van 65 - 95 millimeter is hij een erg krachtige vlieger en leeft hij vooral in licht bebost land, loofbossen en de groenere delen van het leefgebied van de mens. In 2001 zorgde een parasiet voor een plotselinge sterke vermindering van de populatie van de mannelijke blauwe maanvlinders.



Europese moeflon (*Ovis orientalis musimon*), Frankrijk. Dit kleinste wilde schaap valt vooral op door zijn opvallende en indrukwekkende hoorns. De moeflon kwam oorspronkelijk alleen voor op Corsica en Sardinië. Tegenwoordig leeft hij in vele Europese berggebieden, maar op de beide genoemde eilanden wordt hij bedreigd. Daar is zijn meest recente IUCN-status 'kwetsbaar'. Er zijn daar nog slechts enkele honderden individuen.



Van dit kavel is een deel gefotografeerd.

Part of this lot has been photographed.

Ein Teil dieses Loses wurde fotografiert.

Une partie de ce lot a été photographiée.

Часть этого лота сбита.

该拍品的一部分已被拍摄。

このロットの一部が撮影されました。